


Passaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Palaeozoico MORFOLOGIA: Area di diretta e area ricoperte con forme aspri(e)/irregolari, dorsali con profilo netto, etc.]; pendente elevate. DESCRIZIONE: Rocca affiorante, sulla a profilo A-B-C, suborizzontalmente A-B-C, poco profondi, da subsacco franco a franco sabbiosi, permeabili, casualmente desaturati.	
C2	MORFOLOGIA: Versanti inclinati e accidentati, versanti dei canchali e delle vallate a V; pendenze da molto elevata a elevata, quota al di sotto del 900 m. Area parzialmente degradata dall'erosione. DESCRIZIONE: Profili A-C, A-B, A-B-C, A-B-C e interamente porosi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, sabbiosi, parzialmente desaturati.
C3	MORFOLOGIA: Versanti inclinati e accidentati, versanti dei canchali e delle vallate a V; pendenze da molto elevata a elevata, quota al di sotto del 900 m. DESCRIZIONE: Profili A-C, A-B-C e suborizzontalmente rocce affioranti, da poco a mediamente porosi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, sabbiosi, parzialmente desaturati.
C4	MORFOLOGIA: Versanti generici, pendente da elevata a moderata, quota al di sotto del 900 m. DESCRIZIONE: Profili A-B-C e A-B-C, suborizzontalmente A-C, A-B-C.
DESCRIZIONE: Area residuale caratterizzata da intenso degrado, da erosione, pendente variabile da moderata a subverticalmente. DESCRIZIONE: Profili A-B-C e A-B-C, suborizzontalmente A-B-C, da poco profondi a profondi, da franco sabbiosi a franchi, da permeabili a mediamente permeabili, sabbiosi, parzialmente desaturati.	
Sedimenti alluvionali recenti ed attuali	
L1	MORFOLOGIA: Area pianeggiante o leggermente depressa. DESCRIZIONE: Profili A-C e suborizzontalmente A-B-C, poco profondi, da subsacco franco a franco argillosi, da permeabili a poco permeabili, neutri, saturi.